



AFRICAN SWINE FEVER

โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร



เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน ประเทศที่มีการระบาด จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม



อาการของโรค



ตายเฉียบพลัน มีไข้สูง
ผิวหนังแดง มีจุดเลือด
ออกหรือรอยช้ำโดย
เฉพาะใบหู ท้อง ขาค้าง



มีอาการทางระบบอื่น เช่น
ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร
การแท้งในทุกช่วงของ
การตั้งครรภ์




พบทุกกลุ่มและ
ทุกช่วงอายุ



อัตราป่วย 100 %
อัตราตาย 30-100%
ในลูกสุกร อัตราตายสูง
80-100% ภายใน 14 วัน

การติดต่อของโรค

การสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกร
ป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป
การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน
การโดนเห็บที่มีเชื้อกัด



เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อน
เชื้อสามารถแพร่กระจายไวรัสได้

การระบาดของโรค

1 ส.ค. 2561 สาธารณรัฐประชาชนจีน พบการ
ระบาดของโรคนี้และมีแนวโน้มแพร่กระจายใน
วงกว้าง ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่เคยพบ
การระบาด



เมื่อพบสุกรป่วยตายผิดปกติ/มีอาการตามนิยามโรค

- ☒ การป้องกัน : เข้มงวดระบบการป้องกันโรค
เช่น รู้แหล่งที่มาของสุกร ห้ามคนนอกเข้า
ฟาร์ม เป็นต้น
- ☒ แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที
เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือ
หรือติดต่อ Call center : 063-225-6888
หรือแจ้งผ่าน Application DLD 4.0
(แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ☒ ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์ม



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play



กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์